


BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Efektivitas *Transparent Film Dressing* Terhadap Pencegahan Plebitis Pada Terapi Intravena” di RS Hermina Mekarsari dapat diambil kesimpulan:

- 1) Skor plebitis pada area sekitar insersi vena hari pertama (pre test) dengan nilai rata-rata sebesar $0,592 \pm 0,2827$.
- 2) Skor plebitis pada area sekitar insersi vena hari ketiga (post test) dengan nilai rata-rata sebesar $0,600 \pm 0,2887$.
- 3) Tidak terjadinya peningkatan nilai skor pada keseluruhan pasien yang mendapatkan terapi intravena sebelum dan sesudah intervensi.
- 4) Penggunaan *transparent film dressing* mampu mencegah terjadinya plebitis pada terapi intravena (p-value = 0,425).



5.2 Saran

1) Bagi RS Hermina Mekarsari

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta memberikan informasi kepada lembaga pendidikan tentang Efektivitas *Transparant Film Dressing* Terhadap Pencegahan Plebitis Pada Terapi Intravena.

2) Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai *evidence based* dan menambah informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3) Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Kesehatan Universitas Nasional diharapkan dapat memahami cara pencegahan plebitis pada terapi intravena.

4) Bagi Masyarakat

Bagi pasien yang mendapatkan terapi intravena diharapkan dapat memahami tanda dan gejala awal terjadinya plebitis serta cara pencegahan plebitis pada terapi intravena.

