BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan praktik di Wocare Center Bogor melalui Intervensi Penggunaan *Zinc Cream* Pada Fase Proliferasi Klien Ny. Y Dan Tn. A Dengan Luka Kaki Diabetikum Di Wocare Center Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Masalah keperawatan utama pada klien Ny. Y dan Tn. A yaitu gangguan integritas kulit dapat dilakukan dengan memberikan intervensi perawatan luka menggunakan *zinc cream*.
- 5.1.2 Penggunaan *zinc cream* sebagai balutan *primary dressing* sangat efektif untuk mempercepat proses penyembuhan luka, mencegah infeksi, mensupport jaringan granulasi, mengurangi koloni bakteri, mengurangi eksudat.
- 5.1.3 Proses perkembangan luka dengan menggunakan *zinc cream* pada klien dengan luka kaki diabetikum sangat efektif. Dengan perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan pengaplikasian *zinc cream*. Terhadap Ny. Y pada tanggal 22 Agustus 2024, luka berukuran P (3) x L (2) = 6 cm (2 = P X L 4 < 16 cm), kedalaman luka distage (2), tepi luka skore (2) terlihat menyatu dengan dasar luka, skor goa (1) tidak terdapat goa di area manapun, type eksudat (2) *bloody*, jumlah eksudat (3) sedikit, warna kulit sekitar luka pink atau normal (1), tidak ada jaringan yang edema (1), jaringan granulasi (2) Granulasi 100%, epitalisasi skor (2) 75% - 100 %. Total skor Winners Scale

Score adalah 18, berdasarkan skor tersebut maka perkiraan luka sembuh total yaitu 3,9 minggu di bulatkan menjadi 4 minggu. , pada tanggal 26 Agustus 2024, didapatkan luka berukuran $P(3) \times L(2) = 6 \text{ cm}$ ($2 = P \times L$, $4 < 16 \text{ cm}$), kedalaman luka distage (2), tepi luka skore (2) terlihat menyatu dengan dasar luka, skor goa (1) tidak terdapat goa di area manapun, tipe eksudat (2) *bloody*, jumlah eksudat (2) moist, warna kulit sekitar luka pink atau normal (1), tidak ada jaringan yang edema (1), jaringan granulasi (2) Granulasi 100%, epitalisasi skor (2) 75% - 100%. Total skor Winners Scale Score adalah 17, berdasarkan skor tersebut maka perkiraan luka sembuh total yaitu 3,7 minggu di bulatkan menjadi 4 minggu.

Pada Tn. A hasil analisis tanggal 27 Agustus 2024, ukuran luka $P(3) \times L(3) = 9 \text{ cm}$ ($2 = P \times L$, $4 < 16 \text{ cm}$), kedalaman luka stage (2), skor tepi luka (2) terlihat menyatu dengan dasar luka, skor goa (1) tidak ada goa diarea manapun, tipe eksudat (4) serous dengan jumlah eksudat (4) sedang. Warna kulit sekitar luka (3) putih, tidak ada edema (1), skor jaringan granulasi (2) 100%, skor epitelisasi (2) 75% - 100%. Total skor Winners Scale Score adalah 23, berdasarkan skor tersebut maka perkiraan luka sembuh total yaitu 5,0 minggu atau 5 minggu. Pada tanggal 3 September 2024, Ukuran luka $P(3) \times L(3) = 9 \text{ cm}$ ($2 = P \times L$, $4 < 16 \text{ cm}$), kedalaman luka stage (2), skor tepi luka (2) terlihat menyatu dengan dasar luka, skor goa (1) tidak ada goa diarea manapun, tipe eksudat (3) serosanguineous dengan jumlah eksudat (3) sedikit. Warna kulit sekitar luka (3) putih, tidak ada edema (1), skor jaringan granulasi (2) 100%, skor epitelisasi (2) 75% - 100%. Total skor Winners Scale Score adalah 21, maka perkiraan luka

sembuh total yaitu 4,58 minggu atau 5 minggu.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Klinik Wocare Center Bogor

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta acuan dalam memberikan pelayanan perawatan luka modern dengan menggunakan *zinc cream* pada klien dengan luka kaki diabetikum pada fase Proliferasi.

5.2.2 Bagi Prodi Pendidikan Profesi Ners

Diharapkan kepada prodi pendidikan profesi ners untuk dapat mengembangkan ilmu keperawatan dalam bidang *wound care* khususnya terkait penggunaan *primary dressing zinc cream* pada klien dengan diagnosa medis luka kaki diabetikum pada fase Proliferasi.

5.2.3 Bagi Klien

Diharapkan agar klien tetap menjaga kondisi luka dalam keadaan kering, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung protein (telur, ikan, daging, untuk membantu proses penyembuhan luka kaki diabetikum).