

## BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat sebanyak 60% pasien hepatitis B yang mengalami kadar SGOT normal. Terdapat sebanyak 70% pasien hepatitis B yang mengalami peningkatan kadar SGPT. Selain itu terdapat 68% pasien hepatitis B yang mengalami penurunan kadar albumin.
2. Terdapat hasil rata-rata pemeriksaan kadar HBsAg: 3320,683 ; SGOT: 75,720 ; SGPT: 226,400 ; dan albumin: 3,034.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar HBsAg dengan kadar SGPT.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar HBsAg dengan kadar albumin.
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar HBsAg dengan kadar SGPT dan albumin pada penderita hepatitis B dengan pengaruh SGOT.

### B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti berharap:

1. Bagi penderita  
Diharapkan agar selalu melakukan pemeriksaan fungsi hati agar dapat mengetahui bagaimana keadaan organ hati apakah mengalami kerusakan yang parah atau tidak. Selain itu penderita agar tetap menjaga asupan makanan terutama protein, agar kadar protein dan SGPT dalam darah tetap normal.
2. Bagi Peneliti  
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambah jenis pemeriksaan penunjang lainnya untuk test hati yang berkaitan dengan hepatitis B, misalnya pemeriksaan hemostasis seperti PT dan APTT.

### 3. Tenaga Medis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menegakkan diagnosis hepatitis B. Selain itu dapat memantau fase perjalanan penyakit hepatitis B.

