

BAB V

PENUTUP

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan pengkajian dan tindakan keperawatan selama 3 hari pada klien pertama Ny. A dan klien kedua Ny.P,dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Hasil analisa data pada kedua klien berdasarkan pengkajian ditemukan masalah keperawatan utama yaitu menyusui tidak efektif.
- 5.1.2 Intervensi yang diberikan pada kedua klien dengan masalah keperawatan utama menyusui tidak efektif adalah penatalaksanaan pijat oksitosin.
- 5.1.3 Implementasi keperawatan pada klien yakni pijat oksitosin
- 5.1.4 Pengkajian selama tiga hari pada Ny. A Data objektif yang ditemukan pada klien pertama, pengeluaran ASI lancar dan terdapat pengosongan Asi di payudara selama tiga hari intervensi.
- 5.1.5 Pengkajian hari ketujuh pada Ny. P Data objektif yang ditemukan pada klien kedua, pengeluaran ASI hari pertama belum terdapat pengosongan tetapi pada hari kedua lancar dan terdapat pengosongan Asi di payudara selama tiga hari intervensi.
- 5.1.6 Pijat oksitosin terbukti efektif dalam meningkatkan pengeluaran ASI.

5.2 Saran

5.2.1 Manfaat keilmuan

Kasus ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan keperawatan khususnya dalam penatalaksanaan pijat Oksitosin yang ditujukan untuk meningkatkan pengeluaran ASI pada ibu Post SC yang diindikasikan gangguan pengeluaran ASI.

5.2.2 Bagi Penulis

Studi kasus ini dapat menjadi pengalaman dalam mengaplikasikan hasil riset keperawatan khususnya mengenai penatalaksanaan pijat Oksitosin untuk meningkatkan pengeluaran ASI pada ibu Post SC yang diindikasikan gangguan pengeluaran ASI.

5.2.3 Bagi Rumah sakit

Studi kasus ini dapat menjadi ilmu untuk di aplikasikan dalam pelayanan medis dalam pelaksanaan intervensi pada klien yang mengalami masalah dengan menyusui tidak efektif.

5.2.4 Bagi Masyarakat.

Studi kasus ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat bagaimana cara meningkatkan pengeluaran ASI pada ibu Post SC dengan pijat Oksitosin.