

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 64 responden mengenai pengaruh pemberian audio visual terhadap skala nyeri saat imunisasi pada anak usia *toddler* di Puskesmas Depok dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Karakteristik anak saat imunisasi lebih banyak perempuan, pada usia rata-rata usia 12-21 bulan dan berat badan dengan rata-rata 13 kg dengan riwayat imunisasi mayoritas sudah pernah melakukan imunisasi.
- 5.1.2 Skala nyeri pada kelompok intervensi terdapat 56,3 % anak dengan nyeri ringan dan rata-rata 17,13 pada kelompok kontrol terdapat 75,1% anak dengan nyeri berat dan rata-rata 47,88.
- 5.1.3 Ada pengaruh pemberian audio visual terhadap skala nyeri pada anak usia *toddler* di Puskesmas Depok dengan nilai uji *Mann Whitney p Value* = <0,001

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

##### 5.2.1 Bagi Responden

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pemberian audio visual dapat diterapkan ketika dilakukan imunisasi sebagai penanganan nyeri secara non farmakologi.

### **5.2.2 Bagi instansi Puskesmas**

Bagi instansi Puskesmas disarankan untuk memberikan kesempatan bagi para orang tua untuk disarankan memberikan audio visual kepada anak saat dilakukan imunisasi karena berguna untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan pada anak

### **5.2.3 Bagi Fakultas Kesehatan Universitas Nasional**

Penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh pemberian audio visual terhadap skala nyeri saat imunisasi pada anak usia *toddler*. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai pengembangan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan.

### **5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Pengembangan judul dan variabel dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya, seperti dengan kombinasi penggunaan terapi mendekap maupun dengan penanganan non farmakologi lainnya untuk penanganan nyeri pada anak saat imunisasi.

