

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Efektivitas *Polyurethane Foam* Sebagai *Primary Dressing* Terhadap Fase Poliferasi Proses Penyembuhan Luka Pada Pasien *Venous Leg Ulcer di Wocare*” diperoleh kesimpulan:

- 1) Kondisi luka pada pasien *venous leg ulcer* sebelum diberikan *polyurethane foam* terdapat hipergranulasi dan *wound* eksudat yang berlebih didapatkan nilai rata-rata *winner scale pre-test* sebesar  $32,48 \pm 6,319$ .
- 2) Kondisi luka pada pasien *venous leg ulcer* sesudah diberikan *polyurethane foam* hipergranulasi mengalami penurunan dan berkurangnya jumlah *wound* eksudat didapatkan nilai rata-rata *winner scale post test* sebesar  $20,72 \pm 5,884$ .
- 3) Terjadi penurunan nilai skor lembar pengkajian *Winner Scale* pada semua pasien *venous leg ulcer*, sebelum dilakukan intervensi pemberian *polyurethane foam* didapatkan nilai rata-rata *Winner Scale pre-test* sebesar  $32,48 \pm 6,319$  dan sesudah dilakukan intervensi pemberian *polyurethane foam* didapatkan nilai rata-rata skor *Winner Scale post-test* sebesar  $20,72 \pm 5,884$ .
- 4) Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemberian *polyurethane foam* efektif dalam mengontrol hipergranulasi dan menyerap eksudat pada pasien luka *venous leg ulcer* dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ).

## 5.2 Saran

### 1) Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang dan memberikan gambaran kepada institusi pendidikan tentang seberapa efektif penggunaan *polyurethane foam* untuk mempercepat proses penyembuhan luka pada fase proliferasi dengan pasien *venous leg ulcer*.

### 2) Bagi Peneliti

Untuk peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya dan sebagai sumber informasi tambahan.

### 3) Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa terutama mahasiswa keperawatan Universitas Nasional diharapkan dapat memahami cara melakukan perawatan luka dengan baik dan benar sehingga luka dapat cepat sembuh.

### 4) Bagi Masyarakat

Untuk penderita luka pada pasien *venous leg ulcer* diharapkan dapat menggunakan *polyurethane foam* sebagai salah satu upaya untuk mempercepat proses penyembuhan luka pada fase proliferasi pada pasien *VLU*.