

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan praktek profesi asuhan keperawatan dengan pemberian terapi oksigen dengan *Bag Mask Valve (BVM)* pada pasien dengan ARDS yaitu pasien An. A dan An. D selama 15 menit sebelum dilakukan intubasi maka dapat disimpulkan:

5.1.1 Masalah keperawatan utama pada pasien An. A dan An. D yaitu gangguan ventilasi spontan dengan diberikan intervensi terapi oksigen dengan menggunakan *Bag Valve Mask (BVM)*.

5.1.2 Sudah dilakukan analisis asuhan keperawatan dengan intervensi pemberian terapi oksigen dengan *Bag Valve Mask (BVM)* An. A dan An. D yang dilakukan selama 15 menit sesuai dengan rencana tindakan keperawatan. Intervensi berdasarkan pada catatan perkembangan menunjukkan bahwa 2 klien mendapatkan hasil kenaikan pada saturasi oksigen yang di ukur dengan oksimetri monitor bedside yang cukup signifikan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pasien/Keluarga

Diharapkan keluarga pasien dapat memahami kondisi pasien dengan ARDS sebagai suatu keadaan gawat napas yang membutuhkan perawatan intensif.

5.2.2 Bagi RSUD Budhi Asih

Diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model

asuhan keperawatan gawat darurat pada klien dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* dengan pemberian terapi oksigen menggunakan *Bag Valve Mask (BVM)*

5.2.3 Bagi Fikes Universitas Nasional

Diharapkan dapat memberikan rujukan bagi institusi pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* serta dapat memberikan rujukan dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan melakukan intervensi berdasarkan riset-riset terkini.

5.2.4 Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai dasar penulisan lanjutan dan sebagai pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penulisan dalam pemberian Asuhan Keperawatan pada pasien dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* melalui intervensi pemberian oksigen dengan *Bag Valve Mask (BVM)*.

