


## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *Rhabdophis subminiatus* dan *Rhabdophis chrysargoides* dalam pemanfaatan ruang akuatik dan terestrial. Analisis statistik dengan uji Wilcoxon Signed-Rank Test menunjukkan bahwa perbedaan kedua jenis tersebut dalam pemanfaatan ruang akuatik dan terestrial tidak signifikan dengan  $p=0.53$  untuk ruang akuatik, dan  $p=0.46$  untuk ruang terestrial.
2. Tidak ada perbedaan pola aktivitas kedua jenis *Rhabdophis*, hanya durasi yang berbeda. *Rhabdophis subminiatus* dalam 24 jam pengamatan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk statis atau diam sebesar 58,6%, aktivitas bergerak di tempat (*active in place*) sebesar 27,7% dan lokomosi sebesar 13,5%. *R. chrysargoides* menghabiskan waktunya untuk diam atau statis sebesar 75,2%, aktivitas bergerak di tempat (*active in place*) sebesar 16,4% dan aktivitas lokomosi sebesar 8,3%.



## B. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu pengamatan dengan menambahkan faktor pendukung lainnya seperti luminitas, suhu kandang eksperimen, kandang yang lebih luas dan meminimalisir stres pada ular.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait letak kelenjar pada *R. chrysargoides* yang berbeda dari jenis lainnya. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan untuk mengetahui predator alami dari *R. chrysargoides*, dan hubungan letak kelenjar dengan fungsi antipredatornya.

